

## ティブソボを投与した医療機関

医療機関名:

診療科:

担当医師名:

電話番号:

服用開始日

年

月

日

緊急時は上記医療機関にご連絡ください。



2025年4月作成  
M-TIBSO-JP-202501-00005

患者携帯カード

RMP

## ティブソボを服用されている方へ

- 本カードにはティブソボの重要な情報が含まれていますので、常に携帯してください。
- 病院や薬局では、医師、薬剤師、看護師にティブソボを服用していることを伝えてください。
- **本カードに記載する症状があらわれたら、すぐに担当医に連絡し、緊急の治療を受けてください。**

氏名:

緊急連絡先:  
(電話番号)

- ティブソボはIDH1遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病(AML)の治療薬で、アザシチジン(抗がん剤)と併用で投与されます。服用中は、分化症候群、QT間隔延長を含む重篤な副作用があらわれることがあります。
- 適切な治療が行われないと生命を脅かすことがありますので、**以下の症状があらわれたら、すぐに担当医に連絡し、緊急の治療を受けてください。**

### 分化症候群

- 分化症候群は、ティブソボ開始から約1-2ヵ月までにあらわれやすいことが報告されています。

#### 分化症候群が疑われる症状

・発熱 ・皮疹 ・息苦しい ・咳 ・息切れ ・胸の痛み ・むくみ

### QT間隔延長

#### QT間隔延長により引き起こされる症状

・めまい ・動悸 ・意識を失う

## 医療従事者の方へ

- この患者さんは、急性骨髄性白血病(AML)の治療としてIDH1阻害剤ティブソボ(イボシデニブ)を服用しています。
- ティブソボの治療により分化症候群、QT間隔延長を含む重篤な副作用が発現することがあり、適切な治療が行われない場合、生命を脅かす可能性があります。
- **緊急時又はこれらを疑う症状がみられた場合は処方医にご連絡ください。**

詳細は電子化された添付文書をご参照ください。 日本セルヴィエ株式会社 お問い合わせ窓口

GS1バーコード



(01)04987945003012

TEL: 0120-841-002

受付時間: 月~金 9:00~17:00

(祝祭日、弊社休業日を除く)